TD IV Probabilités et Extrêmes

TD IV : Espérance conditionnelle/Catactérisations

- 29 Septembre 2025-2 octobre 2025
- Master I ISIFAR
- Probabilités

Conventions

Dans les 3 exercices qui suivent, X_1, \dots, X_n, \dots constituent une famille indépendante de variables aléatoires identiquement distribuées à valeur dans $\{-1,1\}$.

L'univers des possibles est $\Omega = \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$. Les X_i sont les projections canoniques.

On note \mathcal{F}_n la tribu engendrée par les n premières coordonnées :

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \dots, X_n)$$

L'univers est muni de la tribu des cylindres $\mathcal{F} = \sigma\left(\bigcup_n \mathcal{F}_n\right)$.

On note Δ une constante à valeur dans (0,1) (la dérive de la marche aléatoire).

On note \mathbb{P} la loi produit infini, telle que pour tout $x \in \{-1, 1\}^n$

$$\mathbb{P}\left\{ \bigwedge_{i=1}^{n}X_{i}=x_{i}\right\} =\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2}\left(1+x_{i}\Delta\right)$$

On étudie la marche alétoire sur \mathbb{Z} de dérive Δ .

On note $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

L'indice n représente le temps, S_n la position à l'instant n.

Exercice 1 (Marches aléatoires biaisées i).

- a. Quelle est la loi de S_n ?
- b. S_n est-elle $\mathcal{F}_n, \mathcal{F}_{n-1}, \mathcal{F}_{n+1}$ mesurable? c. Quelle est l'espérance de S_n ?
- d. Quelle est la variance de S_n ?

On admettra l'inégalité de Hoeffding:

Si Y_1, \dots, Y_n sont des variables aléatoires indépendantes telles que $a_i \leq Y_i \leq b_i$ (les Y_i sont bornées), alors

$$P\{Z - \mathbb{E}Z \ge t\} \le e^{-2\frac{t^2}{\sum_{i=1}^{n}(b_i - a_i)^2}}$$

avec $Z = \sum_{i=1}^{n} Y_i$.

Exercice 2 (Marches aléatoires biaisées ii).

Pour $0 \le \tau \le n\Delta$,

- a. Majorer $\mathbb{P}\{S_n \leq \tau\}$ à l'aide de l'inégalité de Chebyshev
- b. Majorer $\mathbb{P}\{S_n \leq \tau\}$ à l'aide de l'inégalité de Hoeffding
- c. L'ensemble

$$E = \{\omega : \forall n, S_n(\omega) < \tau\}$$

appartient-il à la tribu \mathcal{F}_m pour un m donné? est-il un événement de \mathcal{F} ?

d. Si E est un événement, quelle est sa probabilité?

Probabilités et Extrêmes TD IV

Convention

On suppose $\tau \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

On note $T=\inf\{n: S_n\geq \tau\}$. Si $\forall n,\quad S_n(\omega)<\tau, \text{ alors } T(\omega)=\infty.$

On note S_T , la fonction définie par

$$S_T(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{I}_{T(\omega)=n} S_n(\omega) \qquad \text{si } T(\omega) < \infty$$

et $S_T(\omega) = 0$ si $T(\omega) = \infty$.

Exercice 3 (Marches aléatoires biaisées iii).

- a. Pourquoi peut-on considérer que T est une variable aléatoire (à valeur dans $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$)?
- b. Quelle est la probabilité que $T = \infty$?
- c. L'événement $\{T \leq n\}$ est-il $\mathcal{F}_{n-1}, \mathcal{F}_n, \mathcal{F}_{n+1}$ mesurable ?
- d. Pour quoi peut-on considérer que S_T est une variable aléatoire?
- e. Quelle est l'espérance de S_T ?
- f. Montrer que $\mathbb{E}S_T = \Delta \mathbb{E}T$ En déduire $\mathbb{E}T$.

Exercice 4 (Binomiale négative). Les variables X_1, \dots, X_n, \dots sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0,1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du n + 1eme succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité (Ω, \mathcal{F}, P) où $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, \mathcal{F} est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que X_1, \dots, X_n, \dots est une famille indépendante.

- a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires?
- b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
- c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
- d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
- e. Calculer $P\{T_1=k \wedge T_2=k+j\}$ pour $k,j \in \mathbb{N}$
- f. Calculer $P\{T_2=k\}$ pour $k\in\mathbb{N}$
- g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
- h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Exercice 5 (Allocations aléatoires).

On dispose de n urnes numérotées de 1 à n et de n boules. Les boules sont réparties de manière uniforme dans les urnes (chaque boule se comporte de manière indépendante des autres et a probabilité 1/n de tomber dans chaque urne). On note U_i la variable aléatoire désignant le nombre de boules qui tombent dans l'urne i. Dans la suite $\alpha > 1$ est un réel.

- a. Déterminer la loi de U_i .
- b. Montrer que l'on a :

$$\mathbb{P}(\max_{1 \leq i \leq n} U_i > \alpha \ln n) \leq n \mathbb{P}(U_1 > \alpha \ln n).$$

- c. Calculer $\mathbb{E}(\exp(U_1))$.
- d. Montrer que pour tout $\beta > -n$, on a $(1 + \beta/n)^n \le \exp(\beta)$.
- e. Montrer que $\mathbb{P}(U_1>\alpha \ln n) \leq \frac{\exp(\exp(\alpha)-1)}{n^\alpha}$
- f. En déduire que si $\alpha > 1$, on a

$$\mathbb{P}(\max_{1 \leq i \leq n} U_i > \alpha \ln n) \to_{n \to \infty} 0.$$

Probabilités et Extrêmes TD IV

Exercice 6 (Restitution Organisée de Connaissances).

— Soient A, B, C trois événements dans un espace probabilisé. A-t-on toujours : $A \perp \!\!\! \perp B$ et $B \perp \!\!\! \perp C \Rightarrow A \perp \!\!\! \perp C$?

- Soient P et Q deux lois de probabilités sur (Ω, \mathcal{F}) , on définit l'ensemble $\mathcal{M} = \{A : A \in \mathcal{F}, P(A) = Q(A)\}$. Répondre par vrai/faux/je ne sais pas aux questions suivantes :
 - a. \mathcal{M} est-il toujours une classe monotone?
 - b. \mathcal{M} est-il toujours une σ -algèbre?
 - c. \mathcal{M} est-il toujours une π -classe?
- Soient G et F sont deux fonctions génératrices de probabilité. Répondre par vrai/faux aux questions suivantes :
 - a. Est-il vrai que $G \times F$ est toujours une fonction génératrice?
 - b. Est-il vrai que G + F est toujours une fonction génératrice de probabilité?
 - c. Est-il vrai que $\lambda G + (1 \lambda)F$ avec $\lambda \in [0, 1]$ est toujours une fonction génératrice de probabilité?
- Si \hat{F} est la fonction caractéristique de la loi de X, et si $\epsilon \perp \!\!\! \perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

Exercice 7 (Distributions biaisées par la taille).

Si X est une variable aléatoire positive intégrable, la version biaisée par la taille de X est la variable aléatoire X^* dont la loi Q est absolument continue par rapport à celle de X (notée P) et dont la densité (par rapport à celle de X) est proportionnelle à X:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}(x) = \frac{x}{\mathbb{E}X}.$$

- a. Caractériser X^* lorsque X est une Bernoulli.
- b. Caractériser X^* lorsque X est binomiale.
- c. Caractériser X^* lorsque X est Poisson.
- d. Caractériser X^* lorsque X est Gamma.
- e. Si X est à valeurs entières, exprimer la fonction génératrice de X^* en fonction de celle de X.
- f. Exprimer la transformée de Laplace de X^* en fonction de celle de X.
- g. Si U est une transformée de Laplace, dérivable à droite en 0, U'/U'(0) est-elle la transformée de Laplace d'une loi sur $[0, \infty)$?

Exercice 8 (Amies des gaussiennes).

Rappel

La loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ admet pour densité $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$,

- Si $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, donner une densité de la loi de $Y = \exp(X)$ (Loi log-normale). Calculer l'espérance et la variance de Y.
- Même question si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Si $X,Y \sim \mathcal{N}(0,1)$, avec $X \perp \!\!\! \perp Y$, donner une densité de la loi de Z=Y/X (Loi de Student à 1 degré de liberté)
- Si $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, avec $X \perp \!\!\!\perp Y$, donner une densité de la loi de $W = Y/\sqrt{X^2}$.
- Si $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et ϵ vaut ± 1 avec probabilité 1/2 (variable de Rademacher) avec $X \perp \!\!\! \perp \epsilon$, donner une densité de la loi de $Y = \epsilon X$. Y et X sont-elles indépendantes?

Probabilités et Extrêmes TD IV

Exercice 9.

Exercice 10 (Principe de réflexion).

Principe de réflexion

Dans cet exercice, X_1,X_2,\ldots sont des variables de Rademacher indépendantes ($P\{X_i=\pm 1\}=\frac{1}{2}$), $S_n=\sum_{i=1}^n X_i, S_0=0$ et $M_n=\max_{k\leq n} S_n$. Montrer que, pour a>0,

$$P\{M_n>a\}\leq 2P\{S_n>a\}$$

Statistique des rangs/Statistiques d'ordre

Les statistiques d'ordre $X_{1:n} \leq X_{2:n} \leq X_{n:n}$ d'un n-échantillon X_1, \ldots, X_n d'observations indépendantes identiquement distribuées sont formées par le réarrangement croissant (convention) de l'échantillon.

Quand n est clair d'après le contexte on peut les noter $X_{(1)} \leq ... \leq X_{(n)}$.

Exercice 11 (Statistiques d'ordre).

- a. Vérifier que la l:: : oi jointe des statistiques d'ordre est absolument continue par rapport à la loi de l'échantillon.
- b. On suppose que X est une variable aléatoire réelle, absolument continue, de densité continue. Montrer que l'échantillon est presque sûrement formé de valeurs deux à deux distinctes.
- c. Donner la densité de la loi jointe des statistiques d'ordre.
- d. Si la loi des X_i définie par sa fonction de répartition F, admet une densité f, quelle est la densité de la loi de $X_{k:n}$ pour $1 \le k \le n$?
- e. Montrer que conditionnellement à $X_{k:n} = x$, la suite

$$(X_{i:n}-X_{k:n})_{i=k+1,\dots,n}$$

est distribuée comme les statistiques d'ordre d'un n-k échantillon de la loi d'excès au dessus de x (fonction de survie $\overline{F}(x+\cdot)/\overline{F}(x)$) avec la convention $\overline{F}=1-F$).

(Représentation de Rényi)

Exercice 12 (Statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel). Cet exercice reprend:: : les conventions de l'exercice précédent. On s'intéresse maintenant aux statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel.

- a. Si X_1, \ldots, X_n est un échantillon i.i.d. de la loi exponentielle d'espérance 1 (densité $\mathbb{I}_{x>0}\mathrm{e}^{-x}$), et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \ldots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées, montrer que :
- b. avec la convention $X_{0:n}=0$, les écarts $(X_{i:n}-X_{i-1:n})_{1\leq i\leq n}$ (spacings) forment une collection de variables aléatoires indépendantes;
- c. $X_{i:n} X_{i-1:n}$ est distribuée selon une loi exponentielle d'espérance $\frac{1}{i}$.
- d. Maintenant $(k_n)_n$ est une suite croissante d'entiers qui tend vers l'infini, telle que k_n/n tend vers une limite finie (éventuellement nulle). Montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E} X_{k_n:n}}{\sqrt{\operatorname{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.